

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP24-6-68 794841

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 1405.12 K.

25 F.

Supplément n° 2 au Bulletin n° 93 - JUIN 1968

21 JUIN 1968

VIGNE

TOUTES REGIONS -

MILDIOU : Les attaques de Rot gris se sont manifestées, parfois avec violence, très souvent dans les vignes qui n'ont pu être traitées avant le 26 Mai et dont la protection n'a pu, en outre, être assurée dès la réception du bulletin du 29 Mai.

Il convient d'effectuer un traitement soigné, dès la fin de la floraison si possible, à l'aide de produit organo-cuprique de préférence. Bien veiller à mettre la quantité de produit à l'hectare quel que soit le volume de bouillie répandu.

En cas d'impossibilité par suite de fortes précipitations, envisager le traitement à l'aide de poudrage sur grappes, dès réception, même si floraison non terminée.

OIDIUM : Ajouter à la bouillie un soufre micronisé mouillable ou un produit à base de Dinocap.

ARBRES FRUITIERS

POU DE SAN JOSE : Le traitement d'été devant être appliqué au moment de l'apparition des larves, ce traitement obligatoire dans les zones contaminées et de protection devra être effectué avant fin Juin en utilisant :

- soit une bouillie insecticide à base d'Oléoparathion, à raison de 1 litre de produit pour 100 litres d'eau,
- soit une bouillie insecticide composée d'huile blanche (1 litre pour 100 litres d'eau), additionnée de D.D.T. 50 %, à raison de 0 Kg,200 pour 100 litres d'eau.

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES : Il est prudent de renouveler les traitements du fait de l'activité du parasite - nombreuses pénétrations dans les vergers négligés - du grossissement des fruits et du lessivage par les pluies.

Dans les vergers contaminés par la tavelure et l'oïdium, ajouter les fongicides préconisés à la bouillie ci-dessus et éliminer les pousses oïdiées.

P.1.234

POMMES DE TERRE

MILDIOU : Les premières taches ayant été découvertes en situation favorable, sur variétés hâtives, un premier traitement est préconisé sur toutes les variétés dont la végétation atteint 30 à 40 cm et qui ne doivent pas être récoltées dans les prochains jours.

DORYPHORE (RAPPEL) : Ajouter un insecticide à la bouillie antimildiou ou exécuter un traitement spécifique dès que les jeunes larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

CONCOURS DE DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Une prime de DIX FRANCS est attribuée aux premières personnes qui adresseront au SERVICE de la PROTECTION des VÉGÉTAUX, 21, route de Seurre - 21 BEAUNE, les feuilles de pommes de terre atteintes de mildiou.

L'échantillon placé entre deux feuilles de papier buvard humide, devra être accompagné des renseignements suivants :

- Nom :
- Prénom :
- Adresse précise :
- Date de la découverte :
- Variété :
- Date de plantation :
- Importance et situation du foyer :

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE L'OIGNON : Le temps est très favorable au développement de la maladie et de nombreux foyers existent. Il convient de protéger les cultures.

SEPTORIOSE DU CELERI : Un traitement doit être effectué dès réception. Le renouvellement du traitement se fera tous les 10 - 15 jours, en fonction du développement de la végétation et des précipitations naturelles ou artificielles.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés
des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur
de la Protection des Végétaux - Circonscription
Phytosanitaire "BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE" :

H. SOULIE.

Imprimerie de la Station "Bourgogne et Franche-Comté"

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.